

KERNCIJFERS VERSLAVINGSZORG 2006

LANDELIJK ALCOHOL EN DRUGS INFORMATIE SYSTEEM

A.W. Ouwehand
W.G.T. Kuijpers
D.J. Wisselink
E.B. van Delden

Houten, december 2007
Stichting Informatie Voorziening Zorg

SAMENVATTING


Het LADIS bestaat sinds 1986 en is in staat om unieke personen door de jaren heen anoniem te volgen. Hierdoor is het mogelijk om behandelcarrières in beeld te brengen. De in deze publicatie vermelde cijfers zijn de cijfers over 2006.

Over alle individuele hulpvragers in de ambulante verslavingszorg zijn in het LADIS landelijk dekkende gegevens opgenomen. Naast het ambulante en (poli)-klinische hulpaanbod in LADIS, worden ook de gegevens van de reclasseringshulp aan verslaafden opgenomen.

Kerncijfers en trends 2006

In figuur 1 wordt per problematiek het aandeel in de totale hulpvraag aangegeven en in tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen sinds 2005.

Figuur 1 Personen naar primaire problematiek



Tabel 1 Volume en ontwikkeling hulpvraag

Primaire problematiek	Aantal personen in 2006	Verandering t.o.v. 2005	Aandeel in 2006
Alcohol	30.210	-3%	46%
Opiaten	13.180	-7%	20%
Cocaine	9.599	-2%	15%
Amfetamine	1.215	9%	2%
Cannabis	6.544	7%	10%
Gokken	2.646	-12%	4%
Overig	1.999	12%	3%
Totaal	65.393	-2%	100%

Voor het eerst in jaren neemt het totale volume licht af. Dit is voor een deel te verklaren uit de eerder genoemde opschoning van de registratie. De sterke groei van de cocaïnehelpvraag is achter de rug. Deze groep toont de laatste 2 jaar zelfs een lichte daling. Continu groeiend is de groep cannabis-hulpvragers. Deze heeft zich in 5 jaar tijd verdubbeld.

Wat tevens opvalt, is de sterke stijging van amfetaminehulpvraag. Dit aantal is sinds 2001 bijna verdrievoudigd.

In tabel 2 wordt het aantal personen in behandeling bij de verslavingszorg afgezet tegen de omvang van het (geschatte) middelengebruik binnen de Nederlandse bevolking.

Tabel 2 Primaire problematiek naar omvang, gebruik en % in behandeling

Primaire problematiek	Omvang (problematisch) gebruik binnen bevolking	In behandeling in 2006
Alcohol	1.200.000	3%
Opiaten	tussen 24.000-46.000	30-60%
Cocaine	55.000	18%
Amfetamine	22.000	6%
Cannabis	408.000	2%
Gokken	40.000	7%

Bronnen: NDM 2006, LADIS 2006 en Profiel gokklënten

NB. Actueel gebruik: cannabis, amfetamine en cocaine. Problematisch gebruik: alcohol, opiaten en de groep gokken.


Zoals uit deze tabel blijkt, is het bereik van de hulpvraag bij de verslavingszorg behalve in de opiaten- en cocaïnegroep relatief beperkt ten opzichte van de totale groep (problematische) gebruikers van het middel.

Leeftijden

In figuur 2 wordt een overzicht gegeven van de leeftijdsverdeling per problematiek van het jaar 2006. Er is sprake van 'vergrijzing' van de totale verslaafdenpopulatie. De gemiddelde leeftijd blijft toenemen. De enige uitzondering hierop is de amfetaminegroep. De gemiddelde leeftijd in deze groep daalt.

Naast de opiaten- en cocaïnecliënten, stijgt de gemiddelde leeftijd bij cannabisgebruikers het meest. Amfetamine, cannabis en in mindere mate cocaïne zijn nog deels aan te merken als jongerenproblematiek.

Figuur 2 Leeftijdsverdeling naar primaire problematiek



Bron: LADIS 2006, IVZ, Houten

Tabel 3 geeft een overzicht van de verhouding man - vrouw en de toename van beide groepen sinds 2001. Onder de totale groep drugscliënten is circa 20% vrouw terwijl dit bij alcohol 25% is.

Tabel 3 Primaire problematiek naar geslacht

Primaire problematiek	Vrouw 2001	Vrouw 2006	Totaal personen
Alcohol	26%	25%	30.210
Opiaten	21%	20%	13.180
Cocaine	18%	18%	9.599
Amfetamine	23%	23%	1.215
Cannabis	17%	19%	6.544
Gokken	10%	12%	2.646
overig	40%	43%	1.999
Totaal	22%	23%	65.393

Bron: LADIS 2006, IVZ, Houten

Het aantal hulpvragen van vrouwen met problematisch middelengebruik neemt licht toe in de hulpverlening. Voornamelijk bij de groep cannabiscliënten groeit het aantal vrouwen sinds 2001 relatief fors dan bij de mannen. De stijging geldt niet voor de grootste twee groepen: alcohol en opiaten. Wanneer deze buiten beschouwing worden gelaten, bedraagt de toename van het aandeel vrouwen 8%.

Cliëntkenmerken

Spuiten van heroïne blijft afnemen en is nog maar beperkt voorkomend ten opzichte van ons omringende landen.

Tabel 4 Wijze van druggebruik door opiaatgebruikers 2001 - 2006

	2001	2006
Spuiten	12%	10%
Roken	72%	71%
Snuiven	3%	3%
Slikken	6%	12%
Anders	7%	4%
Totaal	100%	100%

Bron: LADIS 2006, IVZ, Houten

In 2006 hebben ruim 14% van de cliënten in de verslavingszorg (ook) een relatie met justitie via de reclasseringstaak van de verslavingszorg. Ruim de helft van deze cliënten hebben alleen contact met de verslavingsreclassering.

Middelengebruik

Het aantal drugcliënten dat zich meldt met polydrugproblemen (dit wil zeggen meer dan 1 middel problematisch gebruiken), is gestegen naar 46% in 2006 (40% in 2005). Binnen de groep polydruggebruikers is cocaïne het meest voorkomende bijmiddel.

Nieuwe cliënten in de verslavingszorg

19% van de personen die zich in 2006 tot de verslavingszorg hebben gewend, meldden zich voor het eerst als cliënt.

Meer dan 80% van de hulpvragers blijft langere tijd of keert regelmatig terug in de hulpverlening.

Tabel 5 Eerste behandeling naar problematiek

Primaire problematiek	'Niet eerder' behandeld 2001	'Niet eerder' behandeld 2006
Alcohol	27%	22%
Opiaten	7%	4%
Cocaïne	22%	16%
Amfetamine	22%	31%
Cannabis	34%	34%
Gokken	28%	28%
Overig	23%	29%
Totaal	20%	19%

Bron: LADIS 2006, IVZ, Houten

Al enige jaren is er nauwelijks groei van het aantal opiaatverslaafden.

Echt nieuwe cliënten komen het meest voor binnen de groep problematisch cannabis- en amfetaminegebruik.